Washington State DEPARTMENT OF SOCIAL & HEALTH SERVICES

WELL CHILD EXAM - INFANCY: 2-4 WEEKS
(Meets EPSDT Guidelines)

DATE

INFANCIA: 2-4 SEMANAS

A SER COMPLETADO POR EL PADRE/MADRE ACERCA DEL NIÑO(A)

NOMBRE DEL NIÑO(A) | FECHA DE NACIMIENTO

ALLERGIAS | MEDICAMENTOS ACTUALES

ENFERMEDADES/ACCIDENTES/PROBLEMAS/PREOCUPACIONES DESDE LA ÚLTIMA VISITA

SÍ	NO		SÍ	NO	
☐	☐	Mi bebé duerme bien.	☐	☐	Mi bebé me mira a la cara.
☐	☐	Mi bebé está comiendo, mamando bien.	☐	☐	Cuando mi bebé llora, se le puede calmar hablándole o alzándole.
☐	☐	Mi bebé escucha los sonidos.	☐	☐	Siento preocupación por mis frecuentes momentos de tristeza.

WEIGHT KG./OZ. PERCENTILE	HEIGHT CM/IN. PERCENTILE	HEAD CIR. PERCENTILE

☐ Review of systems ☐ Review of family history

Screening:	N	A	
Hearing	☐	☐	
Vision	☐	☐	
Development	☐	☐	
Behavior	☐	☐	
Social/Emotional	☐	☐	
Gross Motor	☐	☐	
Fine Motor	☐	☐	

Physical:	N	A		N	A
General appearance	☐	☐	Lungs	☐	☐
Skin	☐	☐	Chest	☐	☐
Head/Fontanelle	☐	☐	Cardiovascular/Pulses	☐	☐
Eyes	☐	☐	Abdomen	☐	☐
Ears	☐	☐	Genitalia	☐	☐
Nose	☐	☐	Spine	☐	☐
Oropharynx	☐	☐	Extremities	☐	☐
Neck	☐	☐	Neurological	☐	☐
Nodes	☐	☐			
Mental Health	☐	☐			

Describe abnormal findings:

Diet _____

Elimination _____

Sleep _____

☐ PKU ☐ Review Immunization Record

☐ Other _____

Health Education/Anticipatory Guidance: (Check all completed)

☐ Family Planning ☐ Safety ☐ Sleeping on back

☐ Development ☐ Crib Safety ☐ Shaken Baby Syndrome

☐ Infant Bond ☐ Feeding/colic ☐ Fever

☐ Passive Smoke ☐ No bottle in bed ☐ Child care

☐ Appropriate Car Seat

☐ Other: _____

Assessment: _____

IMMUNIZATIONS GIVEN

REFERRALS

NEXT VISIT: 4 MONTHS OF AGE

HEALTH PROVIDER NAME

HEALTH PROVIDER SIGNATURE

HEALTH PROVIDER ADDRESS

DSHS 13-683 SP (REV. 08/2001)

☐ SEE DICTATION

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

INFANCY: 2-4 WEEKS

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Infancy (2-4 weeks)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions.
They are not comprehensive guidelines.

Washington Neonatal Screens

- Congenital adrenal hyperplasia (CAH).
- Hemoglobinopathies (Hgb).
- Phenylketonuria (PKU).
- Congenital hypothyroidism (CH).

Hearing Screen

Screen infants with these risk factors:

- Family history of childhood hearing impairment.
- History of congenital prenatal infection with herpes, syphilis, rubella, cytomegalovirus or toxoplasmosis.
- Malformations involving the head or neck (e.g., dysmorphic and syndrome abnormalities, cleft palate, abnormal pinna).
- Birth weight below 1500 grams.
- Bacterial meningitis.
- Hyperbilirubinemia requiring exchange transfusion.
- Severe prenatal asphyxia exchange transfusion.
- Severe prenatal asphyxia (Apgar scores of 0-3, absence of spontaneous respirations for 10 minutes or hypotonia at 2 hours of age).
- Parents concerned about infant's hearing.

Hepatitis B Vaccine

Dosing schedule:

- First dose at birth or other starting date.
- Second dose at least one month after the first dose.

Developmental Milestones

Always ask parents if they have concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or the Denver II, or the ELMS2 (a language screen).

Yes	No	
☐	☐	Regards face.
☐	☐	Lifts head while prone.
☐	☐	Moves extremities equally.
☐	☐	Mother responds to infant cues.

Instructions for developmental milestones: At least 90% of infants should achieve the underlined milestones by this age. If you have checked "no" on *even one* of the underlined items, refer the infant for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. **Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies with questions or concerns on childhood development.**

Washington State DEPARTMENT OF SOCIAL & HEALTH SERVICES

EXAMEN "WELL CHILD" (NIÑOS SANOS) - INFANCIA: 2-4 SEMANAS

WELL CHILD EXAM - INFANCY: 2-4 WEEKS

(Satisface pautas EPSDT)

FECHA

INFANCIA: 2-4 SEMANAS

A SER COMPLETADO POR EL PADRE/MADRE ACERCA DEL NIÑO(A)

NOMBRE DEL NIÑO(A) | FECHA DE NACIMIENTO

ALLERGIAS | MEDICAMENTOS ACTUALES

ENFERMEDADES/ACCIDENTES/PROBLEMAS/PREOCUPACIONES DESDE LA ÚLTIMA VISITA

SÍ	NO		SÍ	NO	
☐	☐	Mi bebé duerme bien.	☐	☐	Mi bebé me mira a la cara.
☐	☐	Mi bebé está comiendo, mamando bien.	☐	☐	Cuando mi bebé llora, se le puede calmar hablándole o alzándole.
☐	☐	Mi bebé escucha los sonidos.	☐	☐	Siento preocupación por mis frecuentes momentos de tristeza.

PESO KG./OZ. PORCENTAJE | ALTURA CM/IN. PORCENTAJE | CIR. DE LA CABEZA PORCENTAJE

☐ Revisión de los sistemas ☐ Revisión del historial familiar

Exploración:

	N	A	
Audición	☐	☐	
Vista	☐	☐	
Desarrollo	☐	☐	
Comportamiento	☐	☐	
Social/Emocional	☐	☐	
Habilidad motora general	☐	☐	
Habilidad motora específica	☐	☐	

Físico:

	N	A		N	A
Apariencia general	☐	☐	Pulmones	☐	☐
Piel	☐	☐	Pecho	☐	☐
Cabeza/Fontanela	☐	☐	Pulsaciones/ Cardiovasculares	☐	☐
Ojos	☐	☐	Abdomen	☐	☐
Oídos	☐	☐	Genitales	☐	☐
Nariz	☐	☐	Columna	☐	☐
Orofaringe	☐	☐	Extremidades	☐	☐
Salud Mental	☐	☐	Sistema Neurológico	☐	☐

Describa anormalidades encontradas:

Alimentación _____

Eliminación _____

Sueño _____

☐ PKU ☐ Revisión del historial de inmunizaciones

☐ Otro _____

Educación de la salud/Guía anticipante: (Marcar lo que se completó)

☐ Planificación familiar ☐ Seguridad ☐ Dormir de espalda

☐ Desarrollo ☐ Seguridad en la cuna ☐ Síndrome del bebé sacudido

☐ Apego del infante ☐ Alimentación/Cólico ☐ Fiebre

☐ ¿Fumador pasivo? ☐ Sin biberón en la cama ☐ Cuidado de niños

☐ Asiento de automóvil apropiado

☐ Otro: _____

Evaluación:

INMUNIZACIONES ADMINISTRADAS

DERIVACIONES

PRÓXIMA VISITA: 2 MESES DE EDAD

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE SALUD

FIRMA DEL PROVEEDOR DE CUIDADO A LA SALUD

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR DE SALUD

DSHS 13-683 SP (REV. 08/2001)

☐ VER DICTADO

INFANCIA: 2-4 SEMANAS

La salud de su bebé a las 2 semanas

Indicadores de logros

Formas de desarrollo de su bebé entre 2 semanas y 2 meses de edad.

Mira su cara cuando usted lo levanta, la sigue cuando se mueve.

Presta atención a su voz.

Demuestra que escucha sonidos cuando se sorprende, parpadea o llora.

Mueve sus brazos y piernas, trata de levantar la cabeza cuando está acostado sobre su barriga.

Trata de decirle lo que necesita poniéndose inquieto o llorando.

Ayuda a su bebé a aprender nuevas aptitudes al jugar con él/ella.

Para ayuda o más información

Para encontrar un médico o conseguir seguro de salud para su niño(a) sin costo o de bajo costo: Línea de Derivación e Información para Healthy Mothers, Healthy Babies (Madres Sanas, Bebés Sanos) 1-800-322-2588 (voz) ó 1-800-833-6388 (TTY - Servicio de Retransmisión)

Información sobre amamantamiento, alimento y salud: Programa para mujeres, infantes, niños(as) (WIC), llame a la Línea de Derivación e Información para Madres Sanas, Bebés Sanos (ver números arriba)

Seguridad del asiento para automóvil: Coalición para Restricción de Seguridad (Safety Restraint Coalition), 1-800-BUCK-L-UP (voz) ó 1-800-833-6388 (TTY - Servicio de Retransmisión)

Consejos de salud

Aprenda a saber cuándo su bebé tiene hambre, para que pueda alimentarle **antes** de que llore. Puede que se ponga inquieto(a) o gire su cabeza hacia su cuerpo cuando le tenga en brazos.

La leche materna es el alimento perfecto para bebés por lo menos durante el primer año. Continúe amamantándole el mayor tiempo posible.

Si le da biberón a su bebé, téngale en sus brazos mientras se lo dé. Su bebé necesita este tiempo especial con usted.

Las inmunizaciones protegen a su bebé de 12 enfermedades muy serias. Asegúrese de que su bebé tenga todas las dosis de vacunas a tiempo.

SIEMPRE acueste a su bebé sobre la espalda para reducir los riesgos del síndrome de muerte súbita infantil (SIDS). También evite colocar ropa de cama blanda o muñecos de peluche en la cuna.

Mantenga a su bebé alejado de personas que tengan un resfriado o tos. Asegúrese de que las personas que lo levanten o le cuiden se laven las manos seguido.

Consejos sobre Paternidad/Maternidad responsable

Dé a su bebé el regalo de su atención. Tome bastante tiempo para alzarle, mirarle a los ojos, hablarle suavemente. Él puede verle y escucharle. ¡Él ya está aprendiendo!

Su bebé se inquieta y llora para tratar de decirle lo que quiere. Consuélelo cuando llore. Alzarle no le hará malcriado.

Consejos de seguridad

Use un asiento infantil para automóvil mirando hacia atrás en cada viaje. Colóquele el cinturón de seguridad en el asiento de atrás, lejos de las bolsas de aire.

NUNCA sacuda a su bebé. El sacudir a su bebé puede causarle serios daños cerebrales. Asegúrese de que toda persona que le cuide sepa esto.

DSHS 13-683 SP (REV. 08/2001)